

Chikungunya

BOLETIN ESPECIAL NO. 10

FECHA: 30/07/2014

HORA: 9:00 PM

Dirección General de Epidemiología

**Comisión
Nacional de
Vigilancia de
la Salud**

Contenido

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

Contactos

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

www.digepi.saludgob.do

SITUACION EN LAS AMERICAS

Hasta el pasado 25 de julio se han notificado 469,620 casos sospechosos de chikungunya en 29 países del continente americano en los cuales se ha identificado transmisión autóctona.

Panamá se agrega a la lista de países con casos autóctonos de chikungunya, mientras que Colombia reportó su primer caso importado.

Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para la respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

SITUACION NACIONAL

MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Del 13/7 al 19/7
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos	307,862
Casos sospechosos nuevos	26,312
Casos confirmados	71
No. de provincias con brotes confirmados	19
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes sospechosas	3


En el país, durante la semana epidemiológica (SE) 29 se notificaron 26,312 nuevos casos sospechosos de chikungunya, para un total de 307,862 casos y una tasa de incidencia acumulada de 2,966 casos por cada 100,000 habitantes.

Gráfico 1. Las diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 29 del 2014, República Dominicana,

Durante esta semana, Samaná y María Trinidad Sánchez se incorporan a la lista de las diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos, sumando cinco las provincias del Cibao que se encuentran en este grupo (Gráfico 1).

San Juan ocupa el primer lugar entre las provincias con mayor número de casos sospechosos notificados esta semana, desplazando de esta posición al Distrito Nacional.

En términos generales en las regiones Metropolitana y Valdesia se observa una tendencia sostenida de decrecimiento en el número de nuevos casos sospechosos.



Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a la respuesta nacional.

-Continuación de la acciones intensificadas de control de los mosquitos mediante aplicación de larvicidas y fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos de forma ambulatoria y los que requieren hospitalización.

Recomendaciones generales

Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres con síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, tuberculosis, cáncer, enfermedades hematológicas, como la falcemia.

5. Personas que presentan los siguientes signos de alarma

- dificultad respiratoria
- dolor abdominal intenso persistente
- dolor de pecho
- vómitos persistentes
- convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia
- sangrados por orificios corporales
- mareos posturales o postración
- fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.