

Comisión
Nacional de
Vigilancia de la
Salud

Contenido

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

Contactos

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

www.digepisalud.gob.do

SITUACION EN LAS AMERICAS

Según datos actualizados de la Organización Panamericana de Salud hasta el 30 de mayo, se han notificado 103,018 casos sospechosos de chikungunya en 18 países de Las Américas que están afectados por esta enfermedad. Las mas alta tasas de incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes la reportan San Martin 11,524 casos, Martinica 7602 , San Bartolomé 7359 y Guadalupe 5,242 y Dominica 2,656.

Dos nuevos países reportan transmisión autóctona, Puerto Rico y Guyana con 1 y 2 casos confirmados respectivamente. Hasta la fecha en 4 países se han notificado 14 fallecimientos relacionados con chikungunya. Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para la respuesta a chikungunya estan disponibles en <http://www.paho.org>.

SITUACION NACIONAL

MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Del 25/5 al 31/5
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos	52,976
No. de provincias con brotes sospechosos	29
No. de provincias con brotes confirmados	6
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes sospechosas	1


Durante la SE-21 se notificaron 13,299 nuevos casos sospechosos de chikungunya, para un acumulado de 52,976 casos en todo el territorio nacional, lo que equivale a una tasa de incidencia de 510 casos por cada 100,000 habitantes.

Las provincias de San Cristóbal (28,281), Santo Domingo (7,832) San Pedro de Macorís (5114), Distrito Nacional (4,398) Hato Mayor (1,916), Independencia (1329) y Baoruco (1,267), continúan concentrando la mayor número de casos.

Curva endémica de enfermedades febriles, SE 21 del 2014, República Dominicana,

En cuanto a la distribución de los casos nuevos reportados al cierre de la SE-21, el 88% (12,013 de 13,299) de los casos proceden de seis provincias, que en orden de frecuencia son San Cristóbal 28% (3,864), Santo Domingo 21% (2,802), San Pedro de Macorís 17% (2,273), Distrito Nacional 12% (1,572), Independencia 5% (685) y Hato Mayor 5% (683).

Al comparar la SE-21 con la SE-20 de este mismo año se observa un incremento de 43% en el número de casos sospechosos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.



Acciones en marcha

- Seguimiento a las acciones intensificadas de control del mosquito *Aedes aegypti* en las provincias con brotes activos.
- Jornadas de movilización social para la sensibilización de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de todos los sectores del país para su integración permanente y sistemática en la respuesta a la epidemia.
- Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.
- Atención de los enfermos según la Guía de manejo clínica establecida por el Ministerio de Salud Pública.
- Reforzamiento del abastecimiento de medicamentos recomendados para el tratamiento ambulatorio en la red de farmacias del pueblo y unidades de atención de febriles.

Recomendaciones generales

Para el cuidado del enfermo

- Reposo en casa, usando mosquitero.
- Manejo de la fiebre: por medios físicos, como paños con agua en cabeza y cuerpo, o baños en ducha o tina (sobre todo para niños).
- Uso de paracetamol (acetaminofén): para el dolor y la fiebre.
- Beber abundante líquidos: agua, jugos, suero oral, a libre demanda.
- Alimentación usual, según apetito.
- Uso de lociones a base de óxido de zinc, lociones refrescantes y humectantes con aloe vera para aliviar el prurito o escozor como son mentol y alcanfor (como Oxina®, Dermizinc®, Prurinol® ó Caladril®), compresas, antihistamínicos de uso común como difenhidramina o loratadina.
- Seguimiento estrecho a los recién nacidos de embarazadas que tienen chikungunya en los próximos al parto.