

**Comisión  
Nacional de  
Vigilancia de la  
Salud**

**Contenido**

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

**Contactos**

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

[www.digepisalud.gob.do](http://www.digepisalud.gob.do)

**SITUACION EN LAS AMERICAS**

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta 165,990 casos sospechosos de chikungunya desde 18 países del continente americano, incluidos los 77,320 notificados hasta la semana epidemiológica 22 por la República Dominicana.

Suman ocho los países que han reportado casos importados pero que aún no tienen transmisión autóctona.

Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para la respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

**SITUACION NACIONAL**

<b>MORBILIDAD Y MORTALIDAD CASOS Y HOSPITALIZACIONES</b>	<b>Del 1/6 al 8/6</b>
Total de casos sospechosos	89,720
Casos sospechosos nuevos	19,469
No. de provincias con brotes confirmados	18
<b>MUERTES Y LETALIDAD</b>	
Total de muertes sospechosas	3

En la SE-23 se notificaron 19,469 nuevos casos sospechosos de chikungunya, para un acumulado de 89,720 casos en todo el territorio nacional, lo que equivale a una tasa de incidencia de 855 casos por cada 100,000 habitantes.

Con apoyo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades se ha confirmado la circulación del virus de chikungunya en 18 provincias del país.

Las investigaciones epidemiológicas han permitido verificar dos nuevas defunciones relacionadas con chikungunya, un niño de 1 mes de edad residente en Hato Mayor y un hombre de 44 años que padecía de esclerodermia residente en Santo Domingo Este.

## Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 23 del 2014, República Dominicana,

San Cristóbal y San Pedro de Macorís volvieron a ocupar las primeras posiciones entre las 10 provincias con mayor número de casos durante la semana 23 .



### Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a la respuesta nacional.

-Continuación de las acciones intensificadas de control de mosquitos mediante fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos que requieren hospitalización.

### Recomendaciones generales

#### Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres con síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer y pacientes con enfermedades hematológicas como la falcemia.
5. Personas con enfermedad febril que presenten los siguientes signos de alarma

- dificultad respiratoria
- dolor abdominal intenso persistente
- vómitos persistentes
- convulsiones o parálisis
- sangrados por orificios corporales
- mareos posturales o postración
- fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.