

SITUACION EN LAS AMERICAS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su boletín del 3 de julio del presente, reporta 302,081 casos sospechosos de chikungunya, incluidos 22 defunciones.

A la lista de los países con transmisión autóctona se agrega Aruba y Las Islas Vírgenes de Estados Unidos, sumando 23 los países afectados por esta enfermedad. Otros once países han reportado 162 casos importados.

Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para la respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

SITUACION NACIONAL

MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Del 22/6 al 28/6
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos	193,395
Casos sospechosos nuevos	32,598
No. de provincias con brotes confirmados	19
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes sospechosas	3

A nivel nacional, en la SE-26 se notificaron 32,598 nuevos casos sospechosos de chikungunya, con un acumulado de 193,395 casos y una tasa de incidencia acumulada de 1,594 casos por cada 100,000 habitantes.

El Laboratorio de Arbovirus del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos reportó esta semana la circulación del virus de chikungunya en el Distrito Nacional. Al respecto la OPS señala que durante una epidemia, no es necesario someter a todos los pacientes a las pruebas confirmatorias, por lo que el vínculo epidemiológico puede ser suficiente.

Comisión

Nacional de

Vigilancia de la Salud

Contenido

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

Contactos

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

www.digepi.saludgob.do


Gráfico 1. Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 26 del 2014, República Dominicana,

En la SE-26, diez provincias reportaron 70% (22,872) de los casos sospechosos de todo el país (Gráfico 1).

En las últimas cuatro semanas (SE 23-26) se observa un aumento considerable en la transmisión del virus de chikungunya en las provincias de las regiones de salud Cibao Norte y Cibao Oriental.

Estas provincias, durante la SE-26 en orden de frecuencia de casos nuevos notificados son Puerto Plata (1946), Duarte (1591), Santiago (1288), Espaillat (1233), María Trinidad Sánchez (930), Samaná (845) y Salcedo (446).

Por otra parte en el Distrito Nacional se observa un incremento de la actividad del dengue lo que aumenta el riesgo de co-infección .



Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a respuesta nacional.

-Continuación de las acciones intensificadas de control de los mosquitos mediante aplicación de larvicidas y fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos de forma ambulatoria y los que requieren hospitalización.

-

Recomendaciones generales

Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades hematológicas, como la falcemia.

5. Personas que presentan los siguientes signos de alarma

- dificultad respiratoria
- dolor abdominal intenso persistente
- dolor de pecho
- vómitos persistentes
- convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia
- sangrados por orificios corporales
- mareos posturales o postración
- fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.