

SITUACION EN LAS AMERICAS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su boletín del 11 de julio del presente, reporta 350,580 casos sospechosos de chikungunya en 23 países . El número de defunciones relacionadas con esta enfermedad se mantiene en 21.

En 13 países se han notificado 205 casos importados, agregándose a este grupo Nicaragua, Paraguay e Isla Caimán.

Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para la respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

Comisión

Nacional de

Vigilancia de la Salud

Contenido

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

Contactos

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

www.digepisalud.gob.do

SITUACION NACIONAL

MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Del 29/6 al 5/7
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos	251,880
Casos sospechosos nuevos	33,491
Casos confirmados	71
No. de provincias con brotes confirmados	19
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes sospechosas	3

En todo el país, durante la SE-27 se notificaron 33,491 nuevos casos sospechosos de chikungunya, para un total de 251,880 casos y una tasa de incidencia acumulada de 2,427 casos por cada 100,000 habitantes.


En relación con la vigilancia de la transmisión madre-hijo del virus de chikungunya, se pudo verificar mediante el seguimiento en el hogar la evolución satisfactoria de 49 recién nacidos menores de 10 días de edad que presentaron sintomatología sospechosa y sus madres tenían la enfermedad en los días próximos al parto.

Gráfico 1. Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 27 del 2014, República Dominicana

En cuanto a la distribución geográfica, Espaillat volvió a colocarse en la lista de la diez provincias con mayor número de casos sospechosos de todo el país (Gráfico 1), mientras que San Juan y La Vega subieron a la segunda y tercera posiciones. Hato Mayor e Independencia descendieron a la posición 14 y 23 respectivamente.

La provincia de San Cristóbal se mantiene en este grupo a expensas de Villa Altagracia y el municipio cabecera.

En las últimas cuatro semanas se ha intensificado la transmisión del virus de chikungunya en las regiones de salud Cibao Norte y Cibao Oriental.



Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a respuesta nacional.

-Continuación de las acciones intensificadas de control de los mosquitos mediante aplicación de larvicidas y fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos de forma ambulatoria y los que requieren hospitalización.

Recomendaciones generales

Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades hematológicas, como la falcemia.
5. Personas que presentan los siguientes signos de alarma
 - dificultad respiratoria
 - dolor abdominal intenso persistente
 - dolor de pecho
 - vómitos persistentes
 - convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia
 - sangrados por orificios corporales
 - mareos posturales o postración
 - fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.